

Les Sorghos

ALLTIME

Sorgho fourrager

- **Excellente productivité en coupe unique**
- **Photo-sensibilité : retarde l'épiaison et assure une très bonne qualité du fourrage**
- **Rusticité et résistance chaleur (40° C)**

SON IDENTITÉ

- | | |
|-----------------------|---|
| - Type sorgho hybride | Sorgho x Sorgho |
| - Débouchés | Ensilage |
| - Précocité | Tardif, lié à la photo-sensibilité |
| - Zones de culture | Toutes zones de culture maïs |
| - Inscription | 2005, Union Européenne |

SES APTITUDES AGRONOMIQUES

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Vigueur départ | Très Bonne |
| - Développement végétatif : | |
| Hauteur de plante | Très Haute |
| Luxuriance | Excellente |
| Ramifications (talles) | Moyennes |
| - Capacité de repousse | Faible |
| - Type de panicule | Compact |
| - Grain et teneur en tanins | Grain moyen – présence possible de tanins |
| - Productivité | Excellente |

SES QUALITÉS TECHNOLOGIQUES

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Valeur alimentaire | Très Bonne |
| - Digestibilité | Très Bonne |
| - Caractère BMR | Non |
| - Photosensibilité | Forte |

CONSEILS DE CULTURE

Semer entre 20 et 40 Kg / Ha selon l'utilisation.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| - Stade de récolte ensilage | Epiaison |
| - Stade de pâturage | Plante supérieure à 60 cm |
| - Délai de retour au pâturage | 30 jours |
| - Conditionnement | Doses de 25 kg |

