

# Les Sorghos

# FRUGAL

## Sorgho fourrager

- **Très bonne digestibilité due au caractère BMR**
- **Excellente productivité**
- **Rusticité et résistance à la chaleur**

### SON IDENTITÉ

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| - Type sorgho hybride | <b>Sorgho x Sudan grass</b>         |
| - Débouchés           | <b>Ensilage et pâturage</b>         |
| - Précocité           | <b>Précoce</b>                      |
| - Zones de culture    | <b>Toutes zones de culture maïs</b> |
| - Inscription         | <b>2005, Union Européenne</b>       |

### SES APTITUDES AGRONOMIQUES

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - Vigueur départ            | <b>Très bonne</b>                                |
| - Développement végétatif   | <b>Très bon</b>                                  |
| - Hauteur de plante         | <b>Haute</b>                                     |
| - Luxuriance                | <b>Excellente</b>                                |
| - Ramifications             | <b>Moyennement nombreuses</b>                    |
| - Capacité de repousse      | <b>Faible</b>                                    |
| - Type de panicule          | <b>Semi-compact</b>                              |
| - Grain et teneur en tanins | <b>Grain moyen – présence possible de tanins</b> |
| - Productivité              | <b>Très bonne</b>                                |

### SES QUALITÉS TECHNOLOGIQUES

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| - Valeur alimentaire | <b>Très bonne</b> |
| - Digestibilité      | <b>Excellente</b> |
| - Caractère BMR      | <b>Oui</b>        |
| - Photosensibilité   | <b>Non</b>        |

### CONSEILS DE CULTURE

**Semer entre 20 et 40 kg/ha.**

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| - Stade de récolte ensilage   | <b>épiaison</b>                  |
| - Stade de pâturage           | <b>Plante supérieure à 60 cm</b> |
| - Délai de retour au pâturage | <b>30 jours</b>                  |
| - Conditionnement             | <b>Doses de 25 kg</b>            |



 LABOULET